

## Multiplications des plantes

Par Jean-Pierre Foussard  
Club des Jardiniers de France  
Compte-rendu de Jacques Fraboulet  
Le 19/2/2011

Monsieur Foussard nous explique théoriquement les multiplications des plantes à l'aide d'un vidéoprojecteur, de belles images et une vidéo.

### Les semis

Puis Jean-Pierre nous fait un semis de salade en expliquant bien comment mettre le terreau dans la barquette, en utilisant du terreau de semis, une planchette pour retirer le terreau excédentaire et une planche munie d'une poignée pour tasser légèrement ce terreau. Puis il sème avec un sachet de graines et avec un semoir.

Il nous explique ensuite comment arroser sans tasser la terre, comme d'arrosoir vers le haut en commençant hors de la barquette.

Il nous dit que pour les graines de bégonia il ne faut pas recouvrir de terreau.

Mettre la barquette dans un endroit confiné comme par exemple une mini-serre de semis.

Maintenir une humidité suffisante par une observation régulière, le temps de la germination.

Placer à lever dans un endroit entre 15° et 20° et à la lumière, pendant le temps nécessaire à la germination (3 jours pour les graines de salades).

### Les bouturages

Monsieur Foussard nous fait des boutures de géraniums, de santoline, d'autres fleurs et de romarin. Il n'utilise pas d'hormone de bouturage, remplit son godet en faisant une bosse.

Ces boutures sont à faire entre le 15 août et le 15 septembre pour avoir plus de chance de réussir.

Il nous explique qu'il ne coupe pas les feuilles afin de réduire l'évaporation, car cette coupure peut-être source de maladie.

Couper avec un cutter ou un couteau bien coupant, un bout de géranium d'extrémité de 7 cm environ, en coupant à 1 mm sous un embranchement, couper les feuilles du bas, faire disparaître les pousses latérales, les parties non adhérentes à la pousse ainsi que les boutons de fleurs. Planter à 2 cm de profondeur dans un godet de 6 cm de haut, plomber sur le côté pour tasser un peu le terreau, ne pas tasser de trop.

Le bouturage peut se faire avec de multiples fleurs, comme le lavatère, car cette fleur supporte mal les grosses gelées et les boutures permettent de pérenniser la fleur.

Avec certaines fleurs à feuille charnue (saintpaulia), il suffit de repiquer la feuille par sa tige dans un godet.

Jean-Pierre nous a montré le bouturage de thuyas et d'autres fleurs.

Une bouture doit prendre racine en un mois environ.

Il nous montre aussi des boutures faites fin novembre et qui sont bonnes à repoter.

### Le marcottage

Jean-Pierre nous montre un Viburnum qu'il a marcotté et qui est en fleurs.



Une bonne réunion ou 25 personnes ont appris beaucoup et sont reparties avec plein d'idées.

Merci à Jean-Pierre Foussard pour toutes ces explications.